

Exploitation : chez turlot  
 Parcelle : les dix  
 Type de sol : limon

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	31
Renouée liseron	27
Chénopode	53
Folle-avoine	34

## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Folle-avoine -2	Oct-d1	220 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 60 Renouée liseron 1 Chénopode 11 Folle-avoine 26	Vulpin -6 Renouée liseron -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Vulpin -4 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Vulpin -4 Renouée liseron 0 Chénopode -0 Folle-avoine -1	Avr-d1 Oct-d3 Vulpin 40 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 14	Vulpin 40 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 14	
Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1				

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Aoû-d3</span>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <span>Aoû-d2</span> <span>Aoû-d1</span> Date de semis du couvert : <span>Non définie</span> Date de destruction : <span>Non définie</span>	<span>Aoû-d3</span>	50 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 89 Renouée liseron 0 Chénopode 31 Folle-avoine 28	Vulpin -6 Renouée liseron -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Vulpin -1 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Folle-avoine -0	Vulpin -3 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Très couvrante Vulpin -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <span>Aoû-d3</span>	<span>Aoû-d3</span>	Vulpin 74 Renouée liseron 0 Chénopode 17 Folle-avoine 17

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span>Oct-d1</span>	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <span>Aoû-d2</span> <span>Aoû-d3</span> Date de semis du couvert : <span>Non définie</span> Date de destruction : <span>Non définie</span>	<span>Oct-d1</span>	240 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83 Renouée liseron 0 Chénopode 9 Folle-avoine 21	Vulpin -6 Renouée liseron -6 Chénopode -6 Folle-avoine -6	Vulpin -4 Renouée liseron 0 Chénopode -3 Folle-avoine -1	Vulpin -4 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Moyennement couvrante Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Bineuse : Houe rotative : <span>Fév-d3</span> Herse étrille : Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	<span>Oct-d2</span> <span>Mar-d1</span>	Vulpin 68 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 10

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d3	11.3 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 39	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Folle-avoine -0	Vulpin -2 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2	Avr-d2	Vulpin 29 Renouée liseron 67 Chénopode 60 Folle-avoine 80
Vulpin -2 Renouée liseron -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2	Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Vulpin -3 Renouée liseron -5 Chénopode -6 Folle-avoine -8		

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d3	75 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 21 Renouée liseron 127 Chénopode 63 Folle-avoine 56	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Folle-avoine -0	Vulpin -2 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3		Vulpin 15 Renouée liseron 107 Chénopode 52 Folle-avoine 46
Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Vulpin -2 Renouée liseron -17 Chénopode -8 Folle-avoine -6		

## Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d1	Nov-d3	280 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 30	Vulpin -10 Renouée liseron -10 Chénopode -10 Folle-avoine -10	Vulpin -1 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Folle-avoine -0	Vulpin -2 Renouée liseron -2 Chénopode -1 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		Vulpin 13 Renouée liseron 6 Chénopode 33 Folle-avoine 71
Vulpin 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0	Vulpin -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1	Vulpin -2 Renouée liseron -1 Chénopode -3 Folle-avoine -5		