

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : bastien
Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	47	
Vulpin	49	
Coquelicot	57	
Folle-avoine	12	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 61	Coquelicot -6	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 73
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 91
Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 49
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Folle-avoine 20

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Coquelicot 53 Folle-avoine 32	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10 Coquelicot -10 Folle-avoine -10	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -7 Vulpin -4 Coquelicot -1 Folle-avoine -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Nov-d3 Ray-grass -2 Vulpin -1 Coquelicot -4 Folle-avoine -0	Désherbage chimique Mar-d2 Oct-d2	Score annuel Ray-grass 75 Vulpin 85 Coquelicot 34 Folle-avoine 17

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Vulpin 14 Coquelicot 46 Folle-avoine 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4 Folle-avoine -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Vulpin -11 Coquelicot -6 Folle-avoine -3	Date de labour Oct-d1 Ray-grass -6 Vulpin -9 Coquelicot -3 Folle-avoine -5	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Folle-avoine 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Folle-avoine -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Folle-avoine -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Nov-d1 Sep-d3 Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -4 Folle-avoine -3	Désherbage chimique Oct-d1 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 27 Folle-avoine 0