

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Miko
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	16	
Ray-grass	25	
Chénopode	33	
Coquelicot	34	
Gaillet	13	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Coquelicot 28</p> <p>Gaillet 13</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Coquelicot -6</p> <p>Gaillet -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>45 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Coquelicot 0</p> <p>Gaillet 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>5 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Coquelicot -1</p> <p>Gaillet -1</p>	<p>Bineuse : Sep-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Coquelicot -2</p> <p>Gaillet -1</p>		<p>Vulpin 50</p> <p>Ray-grass 71</p> <p>Chénopode 21</p> <p>Coquelicot 15</p> <p>Gaillet 0</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m²
Vulpin 8	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 7	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Chénopode 6	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 36	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 75	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Déc-d2 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -2		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Coquelicot 23
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Gaillet 57
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -3		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jan-d3	330 gr/m²
Vulpin 30	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Chénopode 49	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Gaillet 14	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 14
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		Ray-grass 14
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Chénopode 35
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3		Coquelicot 28
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot -3		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet -0		