

Exploitation : La grue
Parcelle : La grande plaine
Type de sol : Néoluvisol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome mou	26	
Chénopode	36	
Ray-grass	23	
Vulpin	22	
Matricaire	47	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Août-d3 Août-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	50 gr/m²
Brome mou 105	Brome mou -10	Brome mou -4	Brome mou 0	Brome mou 0
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Août-d3	
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 88
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 13
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 77
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 73
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 13

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	250 gr/m²
Brome mou 71	Brome mou -4	Brome mou -9	Brome mou -13	Brome mou 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin -16	Vulpin 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille :	Oct-d3 Oct-d2	
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou -1		Brome mou 41
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 22
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 29
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -2		Matricaire 14

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	250 gr/m²
Brome mou 11	Brome mou -10	Brome mou -3	Brome mou -8	Brome mou 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin -10	Vulpin 0
Matricaire 46	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3	
Brome mou -2	Brome mou -1	Brome mou 0		Brome mou 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 30
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 4
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 6
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 28

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Brome mou 11</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Matricaire 42</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 <div>Brome mou -3</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Matricaire -1</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Brome mou -8</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -2</div>	70 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Moyennement couvrante <div>Brome mou -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire -1</div>	<div>Avr-d3</div>	<div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 56</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Matricaire 36</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Brome mou 71</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Matricaire 29</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Brome mou -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Brome mou -10</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Matricaire -3</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>	250 gr/m² <div>Brome mou 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm <div>Brome mou -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div>	Moyennement couvrante <div>Brome mou -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Herse étrille : <div>Brome mou -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -2</div>	<div>Oct-d3 Oct-d2</div>	<div>Brome mou 53</div> <div>Chénopode 1</div> <div>Ray-grass 36</div> <div>Vulpin 41</div> <div>Matricaire 18</div>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Brome mou	69
Chénopode	5
Ray-grass	48
Vulpin	56
Matricaire	23

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Brome mou	-10
Chénopode	-10
Ray-grass	-10
Vulpin	-10
Matricaire	-10

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d2 Aoû-d2
Jul-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Brome mou	-7
Chénopode	-4
Ray-grass	-8
Vulpin	-6
Matricaire	-4

Date de labour

Sep-d2

Brome mou	-13
Chénopode	-3
Ray-grass	-13
Vulpin	-16
Matricaire	-3

Densité de semis

200 gr/m²

Brome mou	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Brome mou	-2
Chénopode	-2
Ray-grass	-2
Vulpin	-2
Matricaire	-2

Variété

Moyennement couvrante

Brome mou	-1
Chénopode	-1
Ray-grass	-1
Vulpin	-1
Matricaire	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Fév-d2

Herse étrille :

Brome mou	0
Chénopode	0
Ray-grass	0
Vulpin	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Oct-d3 Oct-d2

Score annuel

Brome mou	36
Chénopode	0
Ray-grass	15
Vulpin	21
Matricaire	3