

Exploitation : TD8
 Parcelle : Le TD8
 Type de sol : inconnue au bataillon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	19
Matricaire	25
Chénopode	11
Ray-grass	26
Folleavoine	7

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	40 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folleavoine 28	Folleavoine -6	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs				
25 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin -2	Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2	Nov-d1	Vulpin 71
Matricaire -2	Matricaire -1	Vulpin -5		Matricaire 17
Chénopode -2	Chénopode -1	Matricaire -1		Chénopode 17
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Chénopode -2		Ray-grass 75
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Ray-grass -5		Folleavoine 16

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folleavoine 20	Folleavoine -4	Folleavoine -5	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 8 Matricaire 14 Chénopode 0 Ray-grass 12 Folleavoine 7
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine -1		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folleavoine 7	Folleavoine -10	Folleavoine -5	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	Vulpin 0 Matricaire 2 Chénopode 0 Ray-grass 2 Folleavoine 0
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -0		
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -3		
Folleavoine -2	Folleavoine -1	Folleavoine -1		