

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

La ferme du Bois  
Test  
Non renseigné

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

| Adventices :        | Risque : |
|---------------------|----------|
| Matricaire          | 36       |
| Vulpin              | 50       |
| Renouée des oiseaux | 2        |
| Ray-grass           | 51       |

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|---|--|--|---|
| <p>Aoû-d3</p> <p>Matricaire 30</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 96</p> | <p>Association de cultures :<br/>Aucune<br/>Moyen</p> <p>Matricaire -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Renouée des oiseaux -6</p> <p>Ray-grass -6</p> | <p>Date des faux semis :<br/>Aoû-d2 Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert :<br/>Non définie</p> <p>Date de destruction :<br/>Non définie</p> <p>Matricaire -3</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass -5</p> | <p>Pas de labour</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> | <p>40 gr/m²</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p> |
| Entre rangs  | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| <p>25 cm</p> <p>Matricaire -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p> <p>Ray-grass -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p>                                      | <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Matricaire 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 0</p>   | <p>Nov-d1 Sep-d1</p>   | <p>Matricaire 19</p> <p>Vulpin 79</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p> <p>Ray-grass 83</p>              |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                           | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Oct-d2   Sep-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour         | 250 gr/m²             |
| Matricaire 26         | Matricaire -4                                 | Matricaire -3   | Matricaire 0          | Matricaire 0          |
| Vulpin 35             | Vulpin -4                                     | Vulpin -10  | Vulpin 0              | Vulpin 0              |
| Renouée des oiseaux 9 | Renouée des oiseaux -4                        | Renouée des oiseaux 0   | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Ray-grass 35          | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -9  | Ray-grass 0           | Ray-grass 0           |

  

| Entre rangs            | Variété               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
|------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 13 cm                  | Non couvrante         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Oct-d3              |                       |
| Matricaire -2          | Matricaire 0          | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 18         |
| Vulpin -2              | Vulpin 0              | Vulpin 0  |                     | Vulpin 19             |
| Renouée des oiseaux -2 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0                           |                     | Renouée des oiseaux 4 |
| Ray-grass -2           | Ray-grass 0           | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 20          |

## Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                         | Interculture  | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Sep-d3                | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Sep-d3   Sep-d2<br>Sep-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour         | 300 gr/m²             |
| Matricaire 28         | Matricaire -10                              | Matricaire -4   | Matricaire 0          | Matricaire 0          |
| Vulpin 100            | Vulpin -10                                  | Vulpin -14  | Vulpin 0              | Vulpin 0              |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux -10                     | Renouée des oiseaux 0   | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 |
| Ray-grass 80          | Ray-grass -10                               | Ray-grass -15   | Ray-grass 0           | Ray-grass 0           |

  

| Entre rangs           | Variété               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 20 cm                 | Non couvrante         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                       |
| Matricaire 0          | Matricaire 0          | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 13         |
| Vulpin 0              | Vulpin 0              | Vulpin 0  |                     | Vulpin 76             |
| Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0 | Renouée des oiseaux 0                           |                     | Renouée des oiseaux 0 |
| Ray-grass 0           | Ray-grass 0           | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 56          |