

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC GOENVIC
champs de nuit
argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	36	
Ray-grass	41	
Vulpin	39	
Matricaire	32	
Chénopode	12	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Brome stérile 105	Brome stérile -6	Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d3	Oct-d2 Mar-d3 Jan-d3	
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile -6		Brome stérile 89
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -5		Ray-grass 80
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -6		Vulpin 74
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 18
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -1		Chénopode 19

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1	Oct-d1	250 gr/m²
Brome stérile 6	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Ray-grass 7	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -9	Vulpin 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Avr-d2 Fév-d1	Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Matricaire 13
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Sep-d3	Pas de labour	100 gr/m²
Brome stérile 92	Brome stérile -10	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d2 Jan-d2	Brome stérile 76
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile -5		Ray-grass 51
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -3		Vulpin 68
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4		Matricaire 13
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -0		