

Exploitation : LeTD8Bis
Parcelle : Le TD8Bis
Type de sol : inconnue au bataillon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	44	
Folle-avoine	26	
Vulpin	26	
Matricaire	51	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d3 Août-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine -6	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2	Nov-d1	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2		Chénopode 17
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		Folle-avoine 16
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -5		Vulpin 71
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Matricaire 26</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Chénopode -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> <div>Oct-d1</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Vulpin -17</div> <div>Matricaire -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -0</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 7</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Matricaire 14</div>

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Folle-avoine 90</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Matricaire 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Matricaire -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d1</div> <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Folle-avoine -8</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 13 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Folle-avoine -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Matricaire -2</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 45</div> <div>Folle-avoine 65</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Matricaire 29</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Chénopode 31	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 28	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 89	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 31
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 28
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 89
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 30

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Matricaire 26	Matricaire -4	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d3	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -0		Chénopode 0
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine -1		Folle-avoine 7
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -4		Vulpin 8
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire -1		Matricaire 14

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d2

Chénopode 64

Folle-avoine 90

Vulpin 38

Matricaire 48

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Fort

Chénopode -10

Folle-avoine -10

Vulpin -10

Matricaire -10

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1 Fév-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Chénopode -3

Folle-avoine -8

Vulpin -2

Matricaire -4

Date de labour

Pas de labour

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Matricaire 0

Densité de semis

250 gr/m²

Chénopode 0

Folle-avoine 0

Vulpin 0

Matricaire 0

Entre rangs

13 cm

Chénopode -2

Folle-avoine -2

Vulpin -2

Matricaire -2

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Folle-avoine -1

Vulpin -1

Matricaire -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Mar-d2

Chénopode -3

Folle-avoine -5

Vulpin -2

Matricaire -2

Désherbage chimique

Avr-d2

Score annuel

Chénopode 45

Folle-avoine 65

Vulpin 21

Matricaire 29