

Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : La Bête  
Type de sol : argile à silex

## Commentaires :

parcelle en pente à 14ha

## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |  |
|--------------|----------|--|
| Vulpin       | 9        |  |
| Chénopode    | 24       |  |
| Matricaire   | 34       |  |
| Gaillet      | 16       |  |
| Ray-grass    | 18       |  |

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                          | Interculture  | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|----------------|------------------|
| Jul-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen | Date des faux semis :<br>Jul-d1 Jun-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour  | 40 gr/m²         |
| Vulpin 25     | Vulpin -6                                    | Vulpin 0  | Vulpin 0       | Vulpin 0         |
| Chénopode 36  | Chénopode -6                                 | Chénopode -3  | Chénopode 0    | Chénopode 0      |
| Matricaire 28 | Matricaire -6                                | Matricaire -3   | Matricaire 0   | Matricaire 0     |
| Gaillet 1     | Gaillet -6                                   | Gaillet 0   | Gaillet 0      | Gaillet 0        |
| Ray-grass 53  | Ray-grass -6                                 | Ray-grass 0   | Ray-grass 0    | Ray-grass 0      |

  

| Entre rangs   | Variété               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel  |
|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 25 cm         | Moyennement couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Aoû-d2 Sep-d2       |               |
| Vulpin -2     | Vulpin -1             | Vulpin 0  |                     | Vulpin 16     |
| Chénopode -2  | Chénopode -1          | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 23  |
| Matricaire -2 | Matricaire -1         | Matricaire 0                                    |                     | Matricaire 17 |
| Gaillet -2    | Gaillet -1            | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 0     |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -1          | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 44  |

## Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Nov-d1        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1 Sep-d3<br>Oct-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 230 gr/m²        |
| Vulpin 14     | Vulpin -4                                     | Vulpin -16  | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Chénopode 6   | Chénopode -4                                  | Chénopode -4  | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Matricaire 23 | Matricaire -4                                 | Matricaire -4   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Gaillet 84    | Gaillet -4                                    | Gaillet -6  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 18  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -14   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 13 cm         | Moyennement couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Déc-d1 Nov-d1       | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin -1                                     | Vulpin 0  |                     | Chénopode 0      |
| Chénopode -2  | Chénopode -1                                  | Chénopode 0   |                     | Matricaire 12    |
| Matricaire -2 | Matricaire -1                                 | Matricaire 0  |                     | Gaillet 71       |
| Gaillet -2    | Gaillet -1                                    | Gaillet 0   |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -1                                  | Ray-grass 0   |                     |                  |

## Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture                         | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Jan-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort | Date des faux semis :<br>Déc-d3 Déc-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 270 gr/m²        |
| Vulpin 14     | Vulpin -10                                  | Vulpin 0  | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Chénopode 8   | Chénopode -10                               | Chénopode 0   | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Matricaire 24 | Matricaire -10                              | Matricaire -1   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Gaillet 32    | Gaillet -10                                 | Gaillet -6  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 4   | Ray-grass -10                               | Ray-grass 0   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs   | Variété                                     | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 2 cm          | Moyennement couvrante                       | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Fév-d2 Fév-d1  |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin -2     | Vulpin -1                                   | Vulpin -1   |                     | Chénopode 0      |
| Chénopode -2  | Chénopode -1                                | Chénopode -1  |                     | Matricaire 7     |
| Matricaire -2 | Matricaire -1                               | Matricaire -3   |                     | Gaillet 11       |
| Gaillet -2    | Gaillet -1                                  | Gaillet -3  |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass -2  | Ray-grass -1                                | Ray-grass -0  |                     |                  |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|--|---|---------------------|------------------|
| Mai-d3        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Avr-d3   Mai-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 7 gr/m²          |
| Vulpin 0      | Vulpin 0   | Vulpin -2   | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Chénopode 42  | Chénopode 0  | Chénopode -6  | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Matricaire 30 | Matricaire 0                                       | Matricaire -4   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Gaillet 0     | Gaillet 0  | Gaillet -0  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 0   | Ray-grass 0  | Ray-grass -2  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs   | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 50 cm         | Moyennement couvrante                              | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Jun-d1   Jul-d1<br>Jun-d3  |                     | Vulpin 0         |
| Vulpin 0      | Vulpin -1  | Vulpin 0  |                     | Chénopode 29     |
| Chénopode 0   | Chénopode -1                                       | Chénopode -5  |                     | Matricaire 21    |
| Matricaire 0  | Matricaire -1                                      | Matricaire -4   |                     | Gaillet 0        |
| Gaillet 0     | Gaillet -1   | Gaillet 0   |                     | Ray-grass 0      |
| Ray-grass 0   | Ray-grass -1                                       | Ray-grass 0   |                     |                  |

## Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis |
|---------------|---|---|---------------------|------------------|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Sep-d1   Sep-d3<br>Aoû-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour       | 230 gr/m²        |
| Vulpin 60     | Vulpin -4                                     | Vulpin -11  | Vulpin 0            | Vulpin 0         |
| Chénopode 11  | Chénopode -4                                  | Chénopode -5  | Chénopode 0         | Chénopode 0      |
| Matricaire 29 | Matricaire -4                                 | Matricaire -4   | Matricaire 0        | Matricaire 0     |
| Gaillet 97    | Gaillet -4                                    | Gaillet -3  | Gaillet 0           | Gaillet 0        |
| Ray-grass 52  | Ray-grass -4                                  | Ray-grass -13   | Ray-grass 0         | Ray-grass 0      |
| Entre rangs   | Variété                                       | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique | Score annuel     |
| 133 cm        | Moyennement couvrante                         | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :   | Oct-d2   Nov-d3     | Vulpin 44        |
| Vulpin 0      | Vulpin -1                                     | Vulpin 0  |                     | Chénopode 1      |
| Chénopode 0   | Chénopode -1                                  | Chénopode 0   |                     | Matricaire 20    |
| Matricaire 0  | Matricaire -1                                 | Matricaire 0  |                     | Gaillet 90       |
| Gaillet 0     | Gaillet -1                                    | Gaillet 0   |                     | Ray-grass 34     |
| Ray-grass 0   | Ray-grass -1                                  | Ray-grass 0   |                     |                  |

## Année 6 - Orge d'hiver

### Date de semis

Août-d1

|            |    |
|------------|----|
| Vulpin     | 43 |
| Chénopode  | 35 |
| Matricaire | 30 |
| Gaillet    | 5  |
| Ray-grass  | 73 |

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Fort

|            |     |
|------------|-----|
| Vulpin     | -10 |
| Chénopode  | -10 |
| Matricaire | -10 |
| Gaillet    | -10 |
| Ray-grass  | -10 |

### Interculture

Date des faux semis :

Jul-d2 Jul-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

|            |    |
|------------|----|
| Vulpin     | 0  |
| Chénopode  | -3 |
| Matricaire | -2 |
| Gaillet    | 0  |
| Ray-grass  | 0  |

### Date de labour

Pas de labour

|            |   |
|------------|---|
| Vulpin     | 0 |
| Chénopode  | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet    | 0 |
| Ray-grass  | 0 |

### Densité de semis

270 gr/m²

|            |   |
|------------|---|
| Vulpin     | 0 |
| Chénopode  | 0 |
| Matricaire | 0 |
| Gaillet    | 0 |
| Ray-grass  | 0 |

### Entre rangs

2 cm

|            |    |
|------------|----|
| Vulpin     | -2 |
| Chénopode  | -2 |
| Matricaire | -2 |
| Gaillet    | -2 |
| Ray-grass  | -2 |

### Variété

Moyennement couvrante

|            |    |
|------------|----|
| Vulpin     | -1 |
| Chénopode  | -1 |
| Matricaire | -1 |
| Gaillet    | -1 |
| Ray-grass  | -1 |

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Sep-d1 Sep-d3

|            |     |
|------------|-----|
| Vulpin     | -9  |
| Chénopode  | -3  |
| Matricaire | -3  |
| Gaillet    | -3  |
| Ray-grass  | -10 |

### Désherbage chimique

### Score annuel

|            |    |
|------------|----|
| Vulpin     | 21 |
| Chénopode  | 16 |
| Matricaire | 11 |
| Gaillet    | 0  |
| Ray-grass  | 51 |