



Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : 65  
Type de sol : limon sableux

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	52 
Folle-avoine	22 

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88 Folle-avoine 22	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d1 Mar-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 77 Folle-avoine 11

### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Ray-grass 69 Folle-avoine 34	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Folle-avoine -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -5 Folle-avoine -2	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 8 cm Ray-grass -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d2 Nov-d1 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 57 Folle-avoine 25

### Année 3 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Folle-avoine 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Fév-d3 Ray-grass -2 Folle-avoine -4	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -0 Folle-avoine -2	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 17 Folle-avoine 49

### Année 4 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Sep-d3 Ray-grass 80 Folle-avoine 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Folle-avoine -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Sep-d3 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Sep-d3 Ray-grass -3 Folle-avoine -2	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 8 cm Ray-grass -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Très couvrante Ray-grass -2 Folle-avoine -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2 Oct-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 63 Folle-avoine 12