

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Bizouard  
BASCULE BIS  
Argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Séneçon vulgaire	63	
Chénopode	51	
Renouée liseron	35	
Vulpin	17	

## Situation initiale :

### Année 1 - Tournesol

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Séneçon vulgaire 53</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Vulpin 21</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Fév-d3</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Séneçon vulgaire -4</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Densité de semis</p> <p>70 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mai-d3 Avr-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 11</p> <p>Séneçon vulgaire 48</p> <p>Chénopode 58</p> <p>Renouée liseron 119</p> <p>Vulpin 11</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Séneçon vulgaire 41</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Vulpin 35</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Date des faux semis : Oct-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>230 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Nov-d2 Nov-d1 Avr-d1</p> <p>Ray-grass 21</p> <p>Séneçon vulgaire 30</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 20</p>	

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Séneçon vulgaire 41</p> <p>Chénopode 8</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Vulpin 35</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>230 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Nov-d2 Nov-d1 Avr-d1</p> <p>Ray-grass 26</p> <p>Séneçon vulgaire 32</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 26</p>	

## Année 4 - Orge de printemps

### Date de semis

Mar-d2

Ray-grass	35
Séneçon vulgaire	40
Chénopode	64
Renouée liseron	58
Vulpin	38

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Ray-grass	-6
Séneçon vulgaire	-6
Chénopode	-6
Renouée liseron	-6
Vulpin	-6

### Interculture

Date des faux semis :

Fév-d3

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d3

Ray-grass	-1
Séneçon vulgaire	-1
Chénopode	-1
Renouée liseron	0
Vulpin	-1

### Date de labour

Fév-d1

Ray-grass	-6
Séneçon vulgaire	-4
Chénopode	-3
Renouée liseron	-6
Vulpin	-10

### Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Séneçon vulgaire	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Vulpin	0

### Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass	-2
Séneçon vulgaire	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2
Vulpin	-2

### Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Séneçon vulgaire	-1
Chénopode	-1
Renouée liseron	-1
Vulpin	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass	0
Séneçon vulgaire	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

Avr-d1

Mar-d2

### Score annuel

Ray-grass	19
Séneçon vulgaire	26
Chénopode	51
Renouée liseron	43
Vulpin	19