

Exploitation : Ferme du bois
 Parcelle : les larries
 Type de sol : Argilo Calcaire superficiel

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	22

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Chénopode 34	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 11 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2	Désherbage chimique Nov-d2 Sep-d2 Chénopode 16	Score annuel Chénopode 16

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Sep-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d1 Mar-d2 Nov-d1 Chénopode -3	Désherbage chimique Déc-d3 Jan-d2 Chénopode 0	Score annuel Chénopode 0

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis Non définie	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible	Interculture Date des faux semis : Fév-d3 Fév-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Date de labour Nov-d1	Densité de semis 250 gr/m ²
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d2	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort	Interculture Date des faux semis : Fév-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Fév-d1	Date de labour Fév-d1	Densité de semis 250 gr/m ²
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Fév-d3	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Chénopode 29
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -4		