

Exploitation : Lin2000  
 Parcelle : 2022  
 Type de sol : Limon Profond

### Commentaires :

Parcelle à fort potentiel

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47
Ray-grass	28
Renouée liseron	15
Vulpin	24

### Situation initiale :

#### Année 1 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1	Déc-d2	690 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Mar-d2 Avr-d2	Chénopode 63 Ray-grass 32 Renouée liseron 55 Vulpin 34
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 63
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 32
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 55
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 34

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Oct-d2	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d3	Chénopode 2
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Ray-grass 35
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Vulpin 41
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Féverole de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Aoû-d3	45 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 31	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Ray-grass 96	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Vulpin 89	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	Chénopode 15
Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0		Ray-grass 76
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Vulpin 69
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Aoû-d1 Date de destruction : Sep-d2	Oct-d3	280 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8 Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Vulpin 35	Chénopode -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Ray-grass -5 Renouée liseron -3 Vulpin -7	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Chénopode 1 Ray-grass 23 Renouée liseron 0 Vulpin 22
Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0		

## Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	11 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64 Ray-grass 35 Renouée liseron 58 Vulpin 38	Chénopode -6 Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Vulpin -6	Chénopode -2 Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Vulpin -1	Chénopode -1 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Vulpin -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Mar-d2	Chénopode 53 Ray-grass 22 Renouée liseron 47 Vulpin 24
Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode -2 Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Vulpin -2	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Nov-d2	310 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6 Ray-grass 7 Renouée liseron 1 Vulpin 8	Chénopode -4 Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Vulpin -4	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Chénopode -1 Ray-grass -4 Renouée liseron -3 Vulpin -5	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm  Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Moyennement couvrante  Chénopode -1 Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Vulpin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0	Fév-d3 Nov-d3	Chénopode 0 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Vulpin 0