

Exploitation : Bizouard
Parcelle : BASCULE BIS
Type de sol : Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	15	
Séneçon vulgaire	59	
Chénopode	42	
Renouée liseron	37	
Vulpin	13	

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Séneçon vulgaire 52</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Renouée liseron 133</p> <p>Vulpin 15</p>	<p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d2 Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Fév-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Vulpin -5</p>	<p>70 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative : Mai-d2</p> <p>Herse étrille : Avr-d3</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Séneçon vulgaire -7</p> <p>Chénopode -8</p> <p>Renouée liseron -18</p> <p>Vulpin -2</p>		<p>Ray-grass 2</p> <p>Séneçon vulgaire 39</p> <p>Chénopode 40</p> <p>Renouée liseron 107</p> <p>Vulpin 3</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d2	Oct-d3	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Séneçon vulgaire 28
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -5		Vulpin 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Mar-d2	Oct-d3 Mai-d1	Ray-grass 20
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass -2		Séneçon vulgaire 28
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron -5		Vulpin 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin -2		

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d3

Ray-grass 33

Séneçon vulgaire
45

Chénopode 66

Renouée liseron
85

Vulpin 35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass -6

Séneçon vulgaire -6

Chénopode -6

Renouée liseron -6

Vulpin -6

Interculture

Date des faux semis :

Fév-d3 Mar-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d2

Ray-grass -2

Séneçon vulgaire
-2

Chénopode -4

Renouée liseron -1

Vulpin -3

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Séneçon vulgaire
0

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Vulpin 0

Densité de semis

350 gr/m²

Ray-grass 0

Séneçon vulgaire
0

Chénopode 0

Renouée liseron
0

Vulpin 0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass -2

Séneçon vulgaire
-2

Chénopode -2

Renouée liseron
-2

Vulpin -2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Séneçon vulgaire -1

Chénopode -1

Renouée liseron -1

Vulpin -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Avr-d2

Ray-grass -2

Séneçon vulgaire
-2

Chénopode -3

Renouée liseron -5

Vulpin -2

Désherbage chimique

Mar-d3

Score annuel

Ray-grass 20

Séneçon vulgaire
32

Chénopode 50

Renouée liseron
71

Vulpin 22