

Exploitation : EARL de Vaucharmes
 Parcelle : Chénopode
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	49

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d3 Chénopode -2	Date de labour Jan-d1 Chénopode -1	Densité de semis 12 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3	Désherbage chimique Mai-d1 Avr-d1	Score annuel Chénopode 59
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Chénopode 31	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -5	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 25 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d3 Chénopode -3	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Chénopode 16

Année 4 - Maïs

Date de semis Avr-d3 Chénopode 62	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d2 Avr-d1 Aoû-d1 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mai-d2 Chénopode -9	Date de labour Pas de labour Chénopode 0	Densité de semis 100 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Chénopode -3	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Chénopode 49

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -1	Date de labour Oct-d2 Chénopode -1	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d2 Avr-d2 Chénopode -1	Désherbage chimique Nov-d2	Score annuel Chénopode 2