

Exploitation : Ferme du bois  
 Parcelle : les larries  
 Type de sol : Argilo Calcaire superficiel

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Chénopode    | 50       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Date de semis<br><br>Aoû-d2<br><br>Chénopode 34 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Fort<br><br>Chénopode -10 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3<br>Jul-d2<br>Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Chénopode -5 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Chénopode 0       | Densité de semis<br><br>11 gr/m <sup>2</sup><br><br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br><br>45 cm<br><br>Chénopode 0     | Variété<br><br>Moyennement couvrante<br><br>Chénopode -1                              | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Aoû-d3<br>Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Chénopode -2  | Désherbage chimique<br><br>Nov-d2 Sep-d2<br><br>Chénopode 16 | <b>Score annuel</b><br><br>Chénopode 16                         |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Date de semis<br><br>Oct-d2<br><br>Chénopode 11 | Étouffement culture<br><br>Association de cultures : Aucune Faible<br><br>Chénopode -4 | Interculture<br><br>Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Sep-d1<br>Aoû-d1<br>Date de semis du couvert : Non définie<br>Date de destruction : Non définie<br><br>Chénopode -5 | Date de labour<br><br>Pas de labour<br><br>Chénopode 0      | Densité de semis<br><br>250 gr/m <sup>2</sup><br><br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br><br>15 cm<br><br>Chénopode -1    | Variété<br><br>Moyennement couvrante<br><br>Chénopode -1                               | Désherbage mécanique<br><br>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :<br><br>Nov-d1 Mar-d2 Oct-d1<br><br>Chénopode -3   | Désherbage chimique<br><br>Jan-d2 Déc-d3<br><br>Chénopode 0 | <b>Score annuel</b><br><br>Chénopode 0                           |

### Année 3 - Lin de printemps

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis<br>Mar-d2<br>Chénopode 64 | Étouffement culture<br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Chénopode 0 | Interculture<br>Date des faux semis :<br>Fév-d3 Fév-d1<br>Aoû-d2<br>Date de semis du couvert :<br>Aoû-d3<br>Date de destruction :<br>Jan-d1<br>Chénopode -3 | Date de labour<br>Pas de labour<br>Chénopode 0 | Densité de semis<br>250 gr/m <sup>2</sup><br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Chénopode 0     | Variété<br>Non couvrante<br>Chénopode 0  | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Avr-d2 Mar-d2<br>Chénopode -6  | Désherbage chimique<br>Avr-d2                  | Score annuel<br>Chénopode 55                             |

### Année 4 - Betteraves

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Date de semis<br>Fév-d3<br>Chénopode 49 | Étouffement culture<br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Chénopode 0 | Interculture<br>Date des faux semis :<br>Aoû-d1 Fév-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Aoû-d1<br>Date de destruction :<br>Jan-d2<br>Chénopode -2 | Date de labour<br>Jan-d3<br>Chénopode -1 | Densité de semis<br>250 gr/m <sup>2</sup><br>Chénopode 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Chénopode 0     | Variété<br>Non couvrante<br>Chénopode 0  | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d3 Fév-d3<br>Chénopode -4  | Désherbage chimique<br>Mar-d1            | Score annuel<br>Chénopode 41                             |