

Exploitation : Bizouard
Parcelle : New Bascule Chimique
Type de sol : Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	17
Gaillet	30
Chénopode	47
Renouée des oiseaux	57

Situation initiale :

Année 1 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Renouée des oiseaux 92</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d2 Avr-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Août-d3</p> <p>Date de destruction : Fév-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Renouée des oiseaux -11</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée des oiseaux -2</p>	<p>70 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée des oiseaux -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée des oiseaux 0</p>	<p>Mai-d3</p>	<p>Ray-grass 4</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 48</p> <p>Renouée des oiseaux 77</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Nov-d1 Avr-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 80
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -6	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Nov-d1 Avr-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 80
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée des oiseaux -2	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Renouée des oiseaux 0

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis

Mar-d3

Ray-grass 33

Gaillet 4

Chénopode 66

Renouée des oiseaux
128

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass -6

Gaillet -6

Chénopode -6

Renouée des oiseaux
-6

Interculture

Date des faux semis :

Fév-d3 Mar-d2

Date de semis du couvert :

Aoû-d3

Date de destruction :

Fév-d2

Ray-grass -2

Gaillet -1

Chénopode -4

Renouée des oiseaux
-6

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Gaillet 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Densité de semis

350 gr/m²

Ray-grass 0

Gaillet 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

12.5 cm

Ray-grass -2

Gaillet -2

Chénopode -2

Renouée des oiseaux
-2

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass -1

Gaillet -1

Chénopode -1

Renouée des oiseaux
-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Gaillet 0

Chénopode 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage chimique

Avr-d1

Mar-d2

Score annuel

Ray-grass 22

Gaillet 0

Chénopode 53

Renouée des oiseaux
113