

Exploitation : Le pommier
 Parcelle : Montjean
 Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	47
Renouée persicaire	53
Lamier pourpre	43

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1 Chénopode 57 Renouée persicaire 119 Lamier pourpre 58	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d1 Date de destruction : Avr-d3 Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Pas de labour Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	90 gr/m ² Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2 Chénopode -7 Renouée persicaire -15 Lamier pourpre -7		Chénopode 50 Renouée persicaire 104 Lamier pourpre 51

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	90 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Lamier pourpre 58	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille : Mai-d2		Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -7	Renouée persicaire -15	Renouée persicaire 104
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Lamier pourpre -7	Lamier pourpre 51
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0			

Année 3 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	340 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Lamier pourpre 22	Lamier pourpre -10	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0	Lamier pourpre 0
Lamier pourpre 0	Lamier pourpre -1			

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Oct-d1	Pas de labour	340 gr/m ²
Chénopode 5 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 22	Chénopode -10 Renouée persicaire -10 Lamier pourpre -10	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0	Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm Chénopode -0 Renouée persicaire -0 Lamier pourpre -0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée persicaire -1 Lamier pourpre -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 0		Chénopode 0 Renouée persicaire 0 Lamier pourpre 11