

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

LE MOAN
Bar Huella (final)
Sableux léger

Commentaires :

Scénario final

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	63	
Mouron	82	
Renouée liseron	68	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d3</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Mouron 102</p> <p>Renouée liseron 137</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Oct-d3 Oct-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Oct-d3</p> <p>Date de destruction : Fév-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Avr-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Renouée liseron -3</p>	<p>Densité de semis</p> <p>10 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>85 cm</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Renouée liseron 0</p>	<p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Renouée liseron -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Mouron -4</p> <p>Renouée liseron -5</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mai-d2 Avr-d3</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 56</p> <p>Mouron 95</p> <p>Renouée liseron 128</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Mouron 102</div> <div>Renouée liseron 137</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Oct-d3</div> Date de destruction : <div>Fév-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Avr-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée liseron -3</div>	Densité de semis 10 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 85 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -4</div> <div>Renouée liseron -5</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Chénopode 56</div> <div>Mouron 95</div> <div>Renouée liseron 128</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Mouron -10</div> <div>Renouée liseron -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Mouron -1</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Très couvrante <div>Chénopode -2</div> <div>Mouron -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Mouron 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>