

Exploitation : EARL Fremin
Parcelle : 1
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	30	
Vulpin	29	
Chénopode	59	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

<p>Date de semis</p> <p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Chénopode 64</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Déc-d2</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 30</p> <p>Vulpin 32</p> <p>Chénopode 61</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 320 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Nov-d3 Oct-d3	Score annuel Ray-grass 29 Vulpin 29 Chénopode 2

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Vulpin 21 Chénopode 63	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 90 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Ray-grass 18 Vulpin 20 Chénopode 62

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Vulpin 60

Chénopode 11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Entre rangs

12 cm

Ray-grass -2

Vulpin -2

Chénopode -2

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Nov-d2

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass 46

Vulpin 54

Chénopode 5