

Exploitation : lbdb
 Parcelle : betterave
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

betteraves montées/ chénopodes/ folle avoine 10,2 ha
 avant betteraves

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	52
Folle-avoine	34
Matricaire	64

Situation initiale :

Année 1 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 0 Folle-avoine 3 Matricaire 17	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 14
Chénopode -2 Folle-avoine -2 Matricaire -2	Chénopode -1 Folle-avoine -1 Matricaire -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Matricaire 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis Nov-d1 Chénopode 0 Folle-avoine 3 Maticaire 17	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Date de labour Nov-d1 Chénopode -1 Folle-avoine -4 Maticaire -1	Densité de semis 180 gr/m ² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0
Entre rangs 12 cm Chénopode -2 Folle-avoine -2 Maticaire -2	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Folle-avoine -1 Maticaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 13

Année 3 - Lin de printemps

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Folle-avoine 90 Maticaire 48	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d2 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Densité de semis 1600 gr/m ² Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0
Entre rangs 12 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie Chénopode 0 Folle-avoine 0 Maticaire 0	Désherbage chimique Nov-d1	Score annuel Chénopode 64 Folle-avoine 90 Maticaire 48

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Fév-d2	Pas de labour	13.2 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs				
45 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Chénopode 0	Chénopode -2	Bineuse : Jun-d2 Mai-d2	Jun-d2 Mai-d2 Avr-d2 Mar-d2	Chénopode 46
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Houe rotative : Herse étrille :	Folle-avoine -2	Folle-avoine 75
Matricaire 0	Matricaire -2	Chénopode -4	Matricaire -3	Matricaire 32