

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC de l'Hermine  
Couralière  
limoneux-sableux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	56	
Ray-grass	48	
Folle-avoine	27	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Chénopode 71 Ray-grass 27 Folle-avoine 70	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	<b>Densité de semis</b> 8 gr/m² Chénopode 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
<b>Entre rangs</b> 60 cm Chénopode -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Chénopode -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Ray-grass -1 Folle-avoine -2	<b>Désherbage chimique</b> Jun-d1    Avr-d1	<b>Score annuel</b> Chénopode 65 Ray-grass 23 Folle-avoine 65

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 69	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Oct-d1 Mar-d1	
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 6
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 60
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 25

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Chénopode 35	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 73	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 14	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Sep-d1 Mar-d1	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 61
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 2