

Exploitation : GAEC du Pont-Neuf
 Parcelle : Be fief bernier
 Type de sol : Argile à cailloux

Commentaires :

Légèrement en pente

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	45
Vulpin	20
Chénopode	44

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	35 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
19 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2	Nov-d2	Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Vulpin 49
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -1		Chénopode 4
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1		

Année 2 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Renouée liseron 130 Vulpin 9 Chénopode 57	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Nov-d2 Renouée liseron -2 Vulpin -2 Chénopode -1	Densité de semis 11 gr/m ² Renouée liseron 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 12 cm Renouée liseron -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Très couvrante Renouée liseron -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2 Renouée liseron -14 Vulpin -2 Chénopode -6	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Renouée liseron -14 Vulpin -2 Chénopode -6	Score annuel Renouée liseron 110 Vulpin 1 Chénopode 47