

Exploitation : Ferme Cuypers  
Parcelle : glaise  
Type de sol : limons sableux

## Commentaires :

ray-grass résistant important suite à un couvert

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	14	
Chénopode	76	
Matricaire	68	

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Matricaire 42</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Avr-d2</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -5</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Mai-d2 Avr-d2</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -4</p>	<p>Mai-d3 Mai-d1</p>	<p>Ray-grass 14</p> <p>Chénopode 50</p> <p>Matricaire 33</p>