

Exploitation : EARL du HEL MODIF
 Parcelle : rotation principale
 Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	64
Vulpin	21
Mercuriale	50



Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	4 gr/m ²
Chénopode 66 Vulpin 28 Mercuriale 72	Chénopode -10 Vulpin -10 Mercuriale -10	Chénopode -2 Vulpin -1 Mercuriale 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Vulpin -1 Mercuriale -5	Avr-d1 Jul-d1 Jun-d1 Mai-d1	Chénopode 49 Vulpin 14 Mercuriale 55
Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Chénopode -2 Vulpin -2 Mercuriale -2			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Chénopode 15 Vulpin 87 Mercuriale 32	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10 Mercuriale -10	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Mar-d3 Chénopode -2 Vulpin -4 Mercuriale 0	Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	140 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0
Entre rangs 12.5 cm Chénopode -2 Vulpin -2 Mercuriale -2	Variété Très couvrante Chénopode -2 Vulpin -2 Mercuriale -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Mar-d2 Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique Mar-d2 Avr-d2 Mai-d2	Score annuel Chénopode 0 Vulpin 69 Mercuriale 18

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Chénopode 66 Vulpin 28 Mercuriale 72	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10 Mercuriale -10	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -2 Vulpin -1 Mercuriale 0	Avr-d1 Chénopode -1 Vulpin -3 Mercuriale -1	1.3 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Vulpin -2 Mercuriale -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique Jun-d1 Mai-d1	Score annuel Chénopode 50 Vulpin 12 Mercuriale 59

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1 Chénopode 71 Vulpin 28 Mercuriale 84	Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10 Vulpin -10 Mercuriale -10	Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d3 Chénopode -2 Vulpin -1 Mercuriale 0	Pas de labour Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	10 gr/m ² Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0
Entre rangs 75 cm Chénopode 0 Vulpin 0 Mercuriale 0	Variété Très couvrante Chénopode -2 Vulpin -2 Mercuriale -2	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Vulpin -1 Mercuriale -5	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d1 Mai-d1	Score annuel Chénopode 54 Vulpin 14 Mercuriale 67