

Exploitation : EARL Fremin
Parcelle : 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24	
Vulpin	22	
Chénopode	52	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Vulpin 36 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -6 Vulpin -9 Chénopode -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Mar-d2 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Ray-grass 25 Vulpin 25 Chénopode 54

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Chénopode 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Chénopode -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Densité de semis 320 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Chénopode -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div> <div>Nov-d3</div>	Score annuel <div>Ray-grass 25</div> <div>Vulpin 24</div> <div>Chénopode 2</div>

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Ray-grass 12</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 57</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Chénopode -2</div>	Densité de semis Non défini <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 90 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 5</div> <div>Vulpin 5</div> <div>Chénopode 54</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Vulpin 60

Chénopode 11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Entre rangs

12 cm

Ray-grass -2

Vulpin -2

Chénopode -2

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Oct-d2

Nov-d2

Score annuel

Ray-grass 46

Vulpin 54

Chénopode 5