

Exploitation : EARL Fremin
Parcelle : 3
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	22	
Vulpin	20	
Chénopode	50	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33 Vulpin 36 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -6 Vulpin -9 Chénopode -2	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Désherbage mécanique Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -3	Désherbage chimique Mai-d2 Avr-d3 Avr-d2 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 23 Vulpin 23 Chénopode 51

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35 Chénopode 8	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -5 Chénopode -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Densité de semis 320 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 12 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Nov-d3 Oct-d3	Score annuel Ray-grass 25 Vulpin 24 Chénopode 2

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d3 Ray-grass 12 Vulpin 15 Chénopode 57	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Date de labour Déc-d2 Ray-grass -6 Vulpin -9 Chénopode -2	Densité de semis Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs 90 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Vulpin -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Ray-grass 5 Vulpin 5 Chénopode 54

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Ray-grass 52

Vulpin 60

Chénopode 11

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Ray-grass -4

Vulpin -4

Chénopode -4

Interculture

Date des faux semis :

Oct-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Ray-grass -4

Vulpin -5

Chénopode -1

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Entre rangs

12 cm

Ray-grass -2

Vulpin -2

Chénopode -2

Variété

Non couvrante

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Ray-grass 0

Vulpin 0

Chénopode 0

Désherbage chimique

Nov-d2

Oct-d2

Score annuel

Ray-grass 42

Vulpin 49

Chénopode 4