

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

GAEC du Limon  
La scierie  
Limono-argileux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	21	
Chénopode	50	
Folle-avoine	24	
Ray-grass	23	

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 1
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Avr-d2	Mai-d3	9.5 gr/m²
Vulpin 1	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -4	Chénopode 0
Folle-avoine 14	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Ray-grass 6	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Mai-d2	Vulpin 0
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 41
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 5
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Ray-grass 46
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		

Année 4 - Betteraves

Date de semis

Mar-d3

Vulpin	35
Chénopode	66
Folle-avoine	81
Ray-grass	33

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin	0
Chénopode	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Interculture

Date des faux semis :  
Jul-d3 Jul-d2  
Date de semis du couvert :  
Aoû-d3  
Date de destruction :  
Déc-d2

Vulpin	0
Chénopode	-3
Folle-avoine	0
Ray-grass	-1

Date de labour

Déc-d2

Vulpin	-9
Chénopode	-2
Folle-avoine	-7
Ray-grass	-6

Densité de semis

11 gr/m²

Vulpin	0
Chénopode	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Entre rangs

45 cm

Vulpin	0
Chénopode	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Chénopode	-1
Folle-avoine	-1
Ray-grass	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Chénopode	0
Folle-avoine	0
Ray-grass	0

Désherbage chimique

Jun-d1 Mai-d1  
Avr-d2

Score annuel

Vulpin	26
Chénopode	59
Folle-avoine	74
Ray-grass	25