

Exploitation : GAEC du Limon  
 Parcelle : La scierie  
 Type de sol : Limono-argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	7
Chénopode	47
Folle-avoine	20
Ray-grass	11

## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>	
Vulpin 14 Chénopode 6 Folle-avoine 15 Ray-grass 18	Vulpin -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	Vulpin 7 Chénopode 0 Folle-avoine 8 Ray-grass 11	
Vulpin -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0			

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d3</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : <b>Aoû-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d1</b> Date de destruction : <b>Avr-d2</b>	<b>Mai-d3</b>	9.5 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 1 Chénopode 47 Folle-avoine 14 Ray-grass 6	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode -2 Folle-avoine 0 Ray-grass -2	Vulpin -4 Chénopode -2 Folle-avoine -4 Ray-grass -3	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : <b>Jun-d1</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d2</b> <b>Jun-d1</b>	Vulpin 0 Chénopode 41 Folle-avoine 9 Ray-grass 1
Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode -2 Folle-avoine -1 Ray-grass 0		

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Nov-d1</b>	220 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14 Chénopode 6 Folle-avoine 15 Ray-grass 18	Vulpin -4 Chénopode -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin -5 Chénopode -1 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	<b>Nov-d2</b>	Vulpin 3 Chénopode 0 Folle-avoine 6 Ray-grass 8
Vulpin -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0		

## Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d2	Déc-d2	11 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 35 Chénopode 66 Folle-avoine 81 Ray-grass 33	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Chénopode -3 Folle-avoine 0 Ray-grass -1	Vulpin -4 Chénopode -1 Folle-avoine -3 Ray-grass -3	Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode -3 Folle-avoine -0 Ray-grass 0	Jun-d3 Mai-d3 Avr-d2 Mai-d1	Vulpin 30 Chénopode 57 Folle-avoine 77 Ray-grass 28
Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1			