




Exploitation : E.A.R.L. Pouteau
Parcelle : Les vallées
Type de sol : limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48 
Renouée des oiseaux	54 
Ray-grass	19 

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d1 Fév-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -3 Ray-grass -2	Date de labour Déc-d1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -2 Ray-grass -3	Densité de semis 11.5 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -0	Désherbage chimique Avr-d2 Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3	Score annuel Chénopode 60 Renouée des oiseaux 120 Ray-grass 28

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 330 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17.7 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Nov-d1 Mar-d3	Score annuel Chénopode 1 Renouée des oiseaux 2 Ray-grass 28

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis Mai-d1 Chénopode 52 Renouée des oiseaux 69 Ray-grass 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Avr-d2 Avr-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d3 Chénopode -7 Renouée des oiseaux -13 Ray-grass -3	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 70 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Chénopode 41 Renouée des oiseaux 51 Ray-grass 0

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 330 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17.7 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d3 Nov-d1	Score annuel Chénopode 4 Renouée des oiseaux 2 Ray-grass 45

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d1 Chénopode 26 Renouée des oiseaux 30 Ray-grass 13	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Jan-d2 Jan-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d3 Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17.7 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d2	Score annuel Chénopode 19 Renouée des oiseaux 23 Ray-grass 6