

Exploitation : E.A.R.L. Pouteau  
 Parcelle : Les vallées  
 Type de sol : limon sableux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	42
Renouée des oiseaux	52
Ray-grass	25

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Chénopode 66 Renouée des oiseaux 128 Ray-grass 33	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Date des faux semis : Fév-d2 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d1 Chénopode -3 Renouée des oiseaux -3 Ray-grass -2	Déc-d1 Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -2	11.5 gr/m <sup>2</sup> Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Non couvrante Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -0	Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Avr-d3	Chénopode 60 Renouée des oiseaux 121 Ray-grass 29

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 8 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 35	Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 17.7 cm	Variété Moyennement couvrante	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Score annuel
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3 Fév-d3	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 1 Ray-grass 27
Désherbage mécanique	Désherbage chimique			
	Nov-d1 Mar-d3			

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Avr-d3 Avr-d2	Pas de labour	70 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 52 Renouée des oiseaux 69 Ray-grass 5	Chénopode -4 Renouée des oiseaux -4 Ray-grass -4	Date de semis du couvert : Aoû-d1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm	Variété Moyennement couvrante	Date de destruction : Nov-d3	Chénopode -7 Renouée des oiseaux -13 Ray-grass -3	Score annuel
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Jun-d1	Chénopode 41 Renouée des oiseaux 51 Ray-grass 0
Désherbage mécanique	Désherbage chimique			

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11 Renouée des oiseaux 9 Ray-grass 52	Chénopode -6 Renouée des oiseaux -6 Ray-grass -6	Chénopode -3 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -10	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Nov-d2</b> <b>Fév-d2</b>	Nov-d1 Mar-d3	Chénopode 1 Renouée des oiseaux 2 Ray-grass 34
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Chénopode -1 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -1		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	330 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 66	Chénopode -10 Renouée des oiseaux -10 Ray-grass -10	Chénopode -3 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -10	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Nov-d2</b> <b>Fév-d2</b>	Nov-d1	Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 44
Chénopode 0 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Renouée des oiseaux -1 Ray-grass -1	Chénopode -1 Renouée des oiseaux 0 Ray-grass -1		