

Scénario : introduction tournesol
 Exploitation : mellen
 Parcelle : le parc
 Type de sol : limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	33 (50)
Coquelicot	60 (75)
Sanve	34 (43)
Chénopode	35 (45)
Renouée liseron	13 (19)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Ray-grass 88 Coquelicot 28 Sanve 17 Chénopode 34 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Coquelicot -6 Sanve -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -2 Coquelicot -0 Sanve -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Aoû-d2 Ray-grass -10 Coquelicot -3 Sanve -3 Chénopode -4 Renouée liseron -6	40 gr/m ² Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Coquelicot -2 Sanve -2 Chénopode -2 Renouée liseron -2	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Coquelicot -1 Sanve -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -5 Coquelicot -2 Sanve -1 Chénopode -2 Renouée liseron 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Ray-grass 62 Coquelicot 14 Sanve 3 Chénopode 18 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Sanve 21	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 39 Coquelicot 56 Sanve 12 Chénopode 1 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Avr-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d1	45 gr/m ²
Ray-grass 1	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 6	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Sanve 13	Sanve 0	Sanve -11	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 4	Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d2 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Sanve 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -0		
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2		
Sanve 0	Sanve -2	Sanve -3		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -5		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -12		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Sanve 22	Sanve -4	Sanve -2	Sanve 0	Sanve 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Ray-grass 58 Coquelicot 63 Sanve 13 Chénopode 5 Renouée liseron 0
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Sanve -2	Sanve -1	Sanve 0		
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d1	100 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 49	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -4	Coquelicot 0
Sanve 74	Sanve 0	Sanve -1	Sanve -3	Sanve 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 85	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d2 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 24 Coquelicot 43 Sanve 67 Chénopode 57 Renouée liseron 70
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -1		
Sanve 0	Sanve -1	Sanve -2		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -4		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -7		