

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA Monsterleet
12
Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	10	
Laiteron rude	73	
Chénopode	61	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d1 Vulpin 9 Laiteron rude 65 Chénopode 57	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Avr-d3 Vulpin -1 Laiteron rude -1 Chénopode -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0	Densité de semis 9.5 gr/m² Vulpin 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0
Entre rangs 50 cm Vulpin -2 Laiteron rude -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Laiteron rude 0 Chénopode 0	Désherbage chimique Mai-d3	Score annuel Vulpin 6 Laiteron rude 63 Chénopode 53

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Laiteron rude 53</div> <div>Chénopode 66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Chénopode -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Mar-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -2</div>	Date de labour <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -2</div>	Densité de semis 80 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 15</div> <div>Laiteron rude 44</div> <div>Chénopode 55</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Laiteron rude 28</div> <div>Chénopode 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Chénopode -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Sep-d2</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -1</div>	Densité de semis 275 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Désherbage chimique <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 14</div> <div>Laiteron rude 18</div> <div>Chénopode 0</div>