

Exploitation : SCEA Monsterleet  
Parcelle : 12  
Type de sol : Limon

Commentaires :

modifié

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	7	
Laiteron rude	65	
Chénopode	56	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Août-d2	Pas de labour	9.5 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin -4	Date de semis du couvert : Sep-d1	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 65	Laiteron rude -4	Date de destruction : Avr-d3	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Chénopode 57	Chénopode -4	Vulpin -1	Chénopode 0	Chénopode 0
		Laiteron rude -1		
		Chénopode -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d3	Mai-d2	Vulpin 0
Vulpin -2	Vulpin -2	Houe rotative :		Laiteron rude 54
Laiteron rude -2	Laiteron rude -2	Herse étrille :		Chénopode 45
Chénopode -2	Chénopode -2	Vulpin 0		
		Laiteron rude -3		
		Chénopode -2		

## Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Laiteron rude 53</div> <div>Chénopode 66</div>	Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Chénopode -6</div>	Date des faux semis : <div>Mar-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -3</div>	<div>Mar-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -2</div>	80 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Avr-d1</div>	<div>Vulpin 14</div> <div>Laiteron rude 43</div> <div>Chénopode 54</div>

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Laiteron rude 28</div> <div>Chénopode 8</div>	Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Chénopode -6</div>	Date des faux semis : <div>Jun-d2</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Sep-d2</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Laiteron rude -4</div> <div>Chénopode -3</div>	<div>Oct-d1</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Chénopode -1</div>	275 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Vulpin -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Chénopode -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Chénopode 0</div>	<div>Oct-d3</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Vulpin 13</div> <div>Laiteron rude 15</div> <div>Chénopode 0</div>