

Exploitation : EARL de Rambourlieux
Parcelle : 1
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	61	
Laiteron rude	56	
Morelle	1	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Laiteron rude 53</div> <div>Morelle 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Chénopode -6</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Morelle -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Morelle -1</div>	Densité de semis 1800 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 59</div> <div>Laiteron rude 46</div> <div>Morelle 2</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Laiteron rude 28</div> <div>Morelle 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Laiteron rude -10</div> <div>Morelle -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Morelle -1</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -2</div> <div>Morelle -2</div>	Variété Non couvrante <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 15</div> <div>Morelle 0</div>

Année 3 - Betteraves

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Laiteron rude 53</div> <div>Morelle 8</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Chénopode -10</div> <div>Laiteron rude -10</div> <div>Morelle -10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Jan-d1</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Morelle -4</div>	Date de labour <div>Jan-d1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Morelle -1</div>	Densité de semis 10.5 gr/m² <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Chénopode 0</div> <div>Laiteron rude 0</div> <div>Morelle 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Chénopode -1</div> <div>Laiteron rude -1</div> <div>Morelle -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Chénopode -4</div> <div>Laiteron rude -6</div> <div>Morelle -8</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Chénopode 48</div> <div>Laiteron rude 34</div> <div>Morelle 0</div>