

Exploitation : EI de la Bergerie
 Parcelle : Parcelle n°2
 Type de sol : argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	45
Vulpin	45
Agrostis	26

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	180 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Entre rangs				
24 cm	Moyennement couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Mar-d2	Ray-grass 52
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 68
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		Agrostis 20

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	80 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -14	Vulpin 0
Agrostis 25	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Ray-grass 48 Vulpin 62 Agrostis 19
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -6		
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -1		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -17	Vulpin 0
Agrostis 46	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
24 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille :	Mai-d2 Mar-d2	Ray-grass 5 Vulpin 0 Agrostis 40
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis 0		

Année 4 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Ray-grass 97 Vulpin 103 Agrostis 13	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Aoû-d1 Ray-grass -9 Vulpin -9 Agrostis -4	250 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs 24 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage chimique Jun-d1 Avr-d1	Score annuel Ray-grass 89 Vulpin 94 Agrostis 9