




Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Baies Des Champs
Les carrieres 2
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34	
Chénopode	40	
Ray-grass	32	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Chénopode 11 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Chénopode -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode -2 Ray-grass -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Variété Très couvrante Vulpin -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Déc-d1 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Vulpin -1 Chénopode 0 Ray-grass -2	Désherbage chimique Sep-d2	Score annuel Vulpin 50 Chénopode 1 Ray-grass 40

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d3</div> <div>Vulpin 15</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Ray-grass 12</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Fév-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 330 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : <div>Jul-d2</div> Herse étrille : <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Ray-grass -0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 14</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Ray-grass 11</div>

Année 3 - Pois d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Chénopode 5</div> <div>Ray-grass 48</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Densité de semis 65 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Ray-grass 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Ray-grass -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d2</div> Houe rotative : <div>Sep-d3</div> Herse étrille : <div>Mai-d3</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Ray-grass 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Mai-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 55</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Ray-grass 47</div>