

Exploitation : cassou
 Parcelle : blé
 Type de sol : argilite

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49
Ray-grass	44
Coquelicot	83

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d1	200 gr/m ²	
Vulpin 87	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0	
Ray-grass 69	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0	
Coquelicot 71	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d1 Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille : Aoû-d1	Sep-d1	Vulpin 68	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 53	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 58	
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	200 gr/m ²
Vulpin 60	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Coquelicot 64	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d2 Houe rotative : Aoû-d2 Herse étrille : Aoû-d2	Sep-d2	Vulpin 41 Ray-grass 36 Coquelicot 51
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		