

Exploitation : la ferme d'anais
 Parcelle : 40cent
 Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	22

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d1 Ray-grass 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1	Date de labour Mar-d1 Ray-grass -4	Densité de semis Non défini Ray-grass 0
Entre rangs 70 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Avr-d1 Herse étrille : Ray-grass -2	Désherbage chimique Jun-d1	Score annuel Ray-grass 20
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Jan-d1 Herse étrille : Jul-d1 Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d1 Jul-d1	Score annuel Ray-grass 1

Année 2 - Haricot

Date de semis Jun-d1 Ray-grass 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Jan-d1 Date de semis du couvert : Jun-d1 Date de destruction : Mai-d1 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0	Densité de semis 1200 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jul-d1 Ray-grass 0	Désherbage chimique Aoû-d1 Jul-d1	Score annuel Ray-grass 1

Année 3 - Blé de printemps

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	Date de labour Sep-d1 Ray-grass -6	Densité de semis 157 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 25 cm Ray-grass 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 51