

Exploitation : la ferme d'anais
Parcelle : 40cent
Type de sol : limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	9
Datura stramoine	38
Vulpin	8

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d1</p> <p>Ray-grass 27</p> <p>Datura stramoine 25</p> <p>Vulpin 28</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Mar-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Mar-d1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Vulpin -5</p>	<p>Densité de semis</p> <p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>50 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Avr-d1</p> <p>Herse étrille : Mai-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Datura stramoine -0</p> <p>Vulpin -3</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jul-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 16</p> <p>Datura stramoine 20</p> <p>Vulpin 16</p>

Année 2 - Haricot

<p>Date de semis</p> <p>Mai-d2</p> <p>Ray-grass 2</p> <p>Datura stramoine 82</p> <p>Vulpin 4</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Jan-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Jun-d2</p> <p>Date de destruction : Mai-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>1200 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>70 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Jul-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine -5</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 1</p> <p>Datura stramoine 76</p> <p>Vulpin 2</p>

Année 3 - Blé de printemps

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 31</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 31</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Datura stramoine -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Août-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Sep-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Vulpin -3</p>	<p>Date de labour</p> <p>Sep-d3</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Vulpin -8</p>	<p>Densité de semis</p> <p>200 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Variété</p> <p>Très couvrante</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Datura stramoine -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Août-d3 Jul-d3</p> <p>Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille : Nov-d3</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 12</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Vulpin 12</p>