

Exploitation : EARL
 Parcelle : 1
 Type de sol : Argile

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	55
Ray-grass	30

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction : Chénopode 0 Ray-grass 0	Mai-d1	200 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode 52 Ray-grass 5	Chénopode 0 Ray-grass 0	Non définie	Chénopode -2 Ray-grass -4	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Ray-grass 0		Chénopode 48 Ray-grass 0
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction : Chénopode -10 Ray-grass -10	Nov-d1	300 gr/m ² Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode 0 Ray-grass 15	Chénopode -10 Ray-grass -10	Non définie	Chénopode 0 Ray-grass 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -2		Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode -2 Ray-grass -2	Mar-d1		
		Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Ray-grass -1		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d1	200 gr/m ²
Chénopode 35 Ray-grass 73	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -4	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 33 Ray-grass 69
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	300 gr/m ²
Chénopode 6 Ray-grass 7	Chénopode -4 Ray-grass -4	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -1 Ray-grass -4	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Ray-grass 0
Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode -1 Ray-grass -1	Chénopode -3 Ray-grass -2		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	9.5 gr/m ²
Chénopode 40 Ray-grass 48	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -3	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 36 Ray-grass 43
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	200 gr/m ²
Chénopode 21 Ray-grass 92	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -6	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 19 Ray-grass 86
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	7 gr/m ²
Chénopode 66 Ray-grass 27	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -4	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 61 Ray-grass 21
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode 0 Ray-grass 0		

Année 8 - Colza de printemps

Date de semis	Étoffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	40 gr/m ²
Chénopode 31 Ray-grass 96	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -6	Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 24 Ray-grass 87
Chénopode 0 Ray-grass 0	Chénopode -2 Ray-grass -2	Chénopode -3 Ray-grass -2		