

Exploitation : EARL Lhotellier  
 Parcelle : NOQ  
 Type de sol : Brunisol

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Folle-avoine | 32       |
| Vulpin       | 84       |
| Chénopode    | 14       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| Date de semis                                 | Étouffement culture                              | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                            |
| Sep-d3  | Association de cultures :<br>Blé d'hiver<br>Fort | Date des faux semis :<br><b>Sep-d1</b><br>Date de semis du couvert :<br><b>Non définie</b><br>Date de destruction :<br><b>Aoû-d3</b> | Pas de labour                             | 12 gr/m <sup>2</sup>                        |
| Folle-avoine 41<br>Vulpin 104<br>Chénopode 21 | Folle-avoine -10<br>Vulpin -10<br>Chénopode -10  | Folle-avoine -1<br>Vulpin -4<br>Chénopode -2   | Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0 | Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0   |
| Entre rangs                                   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique                       | Score annuel                                |
| 20 cm   | Non couvrante                                    | Bineuse :<br><b>Non définie</b><br>Houe rotative :<br><b>Non définie</b><br>Herse étrille :<br><b>Non définie</b>                    | Sep-d3                                    | Folle-avoine 30<br>Vulpin 90<br>Chénopode 9 |
| Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0     | Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0        | Folle-avoine 0<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0  |   |   |