

Exploitation : EARL Lhotellier
 Parcelle : NOQ
 Type de sol : Brunisol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Folle-avoine	24
Vulpin	71
Chénopode	11

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Sep-d3	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Aoû-d3	Pas de labour	12 gr/m ²	
Folle-avoine 41 Vulpin 104 Chénopode 21	Folle-avoine -10 Vulpin -10 Chénopode -10	Folle-avoine -1 Vulpin -4 Chénopode -2	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Non définie Houe rotative : Non définie Herse étrille : Non définie	Sep-d3	Folle-avoine 30 Vulpin 90 Chénopode 9	
Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0	Folle-avoine 0 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Blé d'hiver Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Aoû-d3	Pas de labour	12 gr/m ²
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Oct-d3 Fév-d2 Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille : Nov-d1 Fév-d3	Nov-d2 Avr-d2 Jan-d1	Folle-avoine 18 Vulpin 66 Chénopode 5
Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine -8		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10		
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3		