

Exploitation :

Parcelle :

Type de sol :




Test

Parcelle Test

Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|---|
| Ray-grass | 51 |  |
| Vulpin | 51 |  |
| Chénopode | 16 |  |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>Date de semis</p> <p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Vulpin 35</p> <p>Chénopode 8</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Chénopode -4</p> | <p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -7</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Chénopode -3</p> | <p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Densité de semis</p> <p>300 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Chénopode -1</p> | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Chénopode 0</p> | <p>Désherbage chimique</p> | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 23</p> <p>Vulpin 27</p> <p>Chénopode 0</p> |

Année 2 - Orge d'hiver

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Chénopode 9</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Chénopode -10</div> | Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Aoû-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -3</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Densité de semis 300 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> |
| Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> | Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Désherbage chimique | Score annuel <div>Ray-grass 48</div> <div>Vulpin 68</div> <div>Chénopode 0</div> |

Année 3 - Colza d'hiver

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Vulpin 89</div> <div>Chénopode 31</div> | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Chénopode -6</div> | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Densité de semis 35 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> |
| Entre rangs 45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> | Désherbage chimique | Score annuel <div>Ray-grass 90</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Chénopode 25</div> |