




Exploitation : EARL Saint Léger
Parcelle : a
Type de sol : limon moyen à profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	32 
Folle-avoine	19 
Chénopode	50 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Mar-d1 Carotte sauvage 34 Folle-avoine 93 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Carotte sauvage -6 Folle-avoine -6 Chénopode -6	Interculture Date des faux semis : Jun-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Carotte sauvage -2 Folle-avoine -0 Chénopode -2	Date de labour Jun-d2 Carotte sauvage -3 Folle-avoine -7 Chénopode -4	Densité de semis 150 gr/m² Carotte sauvage 0 Folle-avoine 0 Chénopode 0
Entre rangs 15 cm Carotte sauvage -2 Folle-avoine -2 Chénopode -2	Variété Moyennement couvrante Carotte sauvage -1 Folle-avoine -1 Chénopode -1	Désherbage mécanique Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Carotte sauvage -3 Folle-avoine -4 Chénopode -3	Désherbage chimique Sep-d3 Aoû-d2 Jul-d1	Score annuel Carotte sauvage 17 Folle-avoine 73 Chénopode 40

Année 2 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d3</p> <p>Carotte sauvage 22</p> <p>Folle-avoine 8</p> <p>Chénopode 36</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Carotte sauvage -3</p> <p>Folle-avoine -4</p> <p>Chénopode -3</p>	<p>Jul-d2</p> <p>Carotte sauvage -3</p> <p>Folle-avoine -7</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>120 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs 30 cm</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété Moyennement couvrante</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Chénopode -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Sep-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Déc-d3 Nov-d2 Mai-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Carotte sauvage 16</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 28</p>

Année 3 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jun-d2</p> <p>Carotte sauvage 29</p> <p>Folle-avoine 3</p> <p>Chénopode 36</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Sep-d3</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Mai-d2</p> <p>Carotte sauvage -4</p> <p>Folle-avoine -9</p> <p>Chénopode -4</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>
<p>Entre rangs 15 cm</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 0</p>	<p>Variété Très couvrante</p> <p>Carotte sauvage -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jun-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage -2</p> <p>Folle-avoine -0</p> <p>Chénopode -2</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d2 Sep-d3 Aoû-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Carotte sauvage 21</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Chénopode 28</p>