






Exploitation : Ferme Antoine
Parcelle : Grand Est sdc alternatif
Type de sol : Limono-argilo-sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|---|
| Chénopode | 50 |  |
| Ray-grass | 19 |  |
| Vulpin | 14 |  |
| Chénopode | 50 |  |
| Coquelicot | 48 |  |

Systeme de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Déc-d1 | 10 gr/m² |
| Chénopode 68 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass -10 | Ray-grass 0 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Chénopode 68 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 39 | Coquelicot -10 | Coquelicot 0 | Coquelicot -2 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 | |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -5 | | Chénopode 50 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass -0 | | Ray-grass 5 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | Vulpin 5 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -5 | | Chénopode 50 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot -1 | Coquelicot -1 | | Coquelicot 25 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 Oct-d3 | |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 2 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 29 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Vulpin 29 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Chénopode 2 |
| Coquelicot -1 | Coquelicot -1 | Coquelicot 0 | | Coquelicot 50 |

Année 3 - Autre culture de print.

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Déc-d2 | Pas de labour | 75 gr/m² |
| Chénopode 47 | Chénopode -6 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 2 | Ray-grass -6 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 47 | Chénopode -6 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 15 | Coquelicot -6 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mai-d1 | Jun-d2 | Chénopode 36 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Ray-grass 0 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Vulpin 0 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Chénopode 36 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Coquelicot 8 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot -1 | Coquelicot 0 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 250 gr/m² |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 35 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 35 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 8 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 55 | Coquelicot -4 | Coquelicot -4 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d3 Nov-d2 | Chénopode 1 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Ray-grass 25 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | | Vulpin 24 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | Chénopode 1 |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | Coquelicot 46 |
| Coquelicot -1 | Coquelicot -1 | Coquelicot 0 | | |

Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------------------|------------------|
| Aoû-d2 | Association de cultures : Féverole de printemps Fort | Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 40 gr/m² |
| Chénopode 34 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 88 | Ray-grass -10 | Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 68 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 34 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 28 | Coquelicot -10 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 30 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 Oct-d3 Nov-d2 | |
| Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode -2 | | Chénopode 15 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass -1 | Ray-grass -4 | | Ray-grass 69 |
| Vulpin -2 | Vulpin -1 | Vulpin -6 | | Vulpin 49 |
| Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode -2 | | Chénopode 15 |
| Coquelicot -2 | Coquelicot -1 | Coquelicot -4 | | Coquelicot 11 |

Année 6 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 | Pas de labour | 10 gr/m² |
| Chénopode 68 | Chénopode -6 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Ray-grass 19 | Ray-grass -6 | Ray-grass -3 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin -6 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Chénopode 68 | Chénopode -6 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Coquelicot 39 | Coquelicot -6 | Coquelicot -0 | Coquelicot 0 | Coquelicot 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 75 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Jun-d1 | |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -5 | | Chénopode 52 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass -1 | Ray-grass -0 | | Ray-grass 9 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | Vulpin 12 |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -5 | | Chénopode 52 |
| Coquelicot 0 | Coquelicot -1 | Coquelicot -1 | | Coquelicot 30 |