

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

MGT
Plateau
Limon battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26	
Vulpin	22	
Chénopode	54	
Coquelicot	64	
Folle-avoine	32	

Situation initiale :

Année 1 - Lin de printemps

Date de semis <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Vulpin 38</div> <div>Chénopode 64</div> <div>Coquelicot 50</div> <div>Folle-avoine 90</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Coquelicot -0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date de labour <div>Déc-d2</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Folle-avoine -3</div>	Densité de semis 650 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div> <div>Mar-d2</div>	Score annuel <div>Ray-grass 30</div> <div>Vulpin 33</div> <div>Chénopode 60</div> <div>Coquelicot 47</div> <div>Folle-avoine 86</div>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d2 Mar-d2	Ray-grass 63 Vulpin 81 Chénopode 9 Coquelicot 65 Folle-avoine 28
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour	330 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 30	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 49	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 41	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d1	Ray-grass 14 Vulpin 18 Chénopode 35 Coquelicot 28 Folle-avoine 77
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d2 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	40 gr/m²
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine -6	Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d1 Oct-d1 Août-d2	
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 74
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 58
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 21
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	290 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Folle-avoine 15	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mar-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 12
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 9
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 39
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 9

Année 6 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Chénopode 66</div> <div>Coquelicot 44</div> <div>Folle-avoine 69</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Date des faux semis : Août-d1 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Déc-d2 <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Coquelicot -0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	20 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass -0</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -2</div>	<div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div> <div>Avr-d1</div>	<div>Ray-grass 24</div> <div>Vulpin 27</div> <div>Chénopode 60</div> <div>Coquelicot 42</div> <div>Folle-avoine 66</div>

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass 7</div> <div>Vulpin 8</div> <div>Chénopode 6</div> <div>Coquelicot 36</div> <div>Folle-avoine 13</div>	Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Coquelicot -4</div> <div>Folle-avoine -4</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	320 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Folle-avoine -1</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Folle-avoine 0</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Mar-d2</div>	<div>Ray-grass 1</div> <div>Vulpin 2</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Coquelicot 30</div> <div>Folle-avoine 7</div>