


Exploitation : EARL La Rainière  
Parcelle : 1  
Type de sol : Argilo-Limoneux

Commentaires :


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	<div>47</div> 

## Situation initiale :

### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Oct-d2"/> Ray-grass <input type="text" value="52"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass <input type="text" value="-4"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Ray-grass <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 18 cm Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Nov-d2"/> <input type="text" value="Oct-d2"/>	<b>Score annuel</b> Ray-grass <input type="text" value="48"/>

### Année 2 - Tournesol

<b>Date de semis</b> <input type="text" value="Avr-d2"/> Ray-grass <input type="text" value="19"/>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Date de labour</b> <input type="text" value="Nov-d2"/> Ray-grass <input type="text" value="-2"/>	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Ray-grass <input type="text" value="0"/>
<b>Entre rangs</b> 60 cm Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass <input type="text" value="0"/>	<b>Désherbage chimique</b> <input type="text" value="Avr-d2"/>	<b>Score annuel</b> Ray-grass <input type="text" value="18"/>

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 52	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 18 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d2 Oct-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 48

### Année 4 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d2 Ray-grass 88	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 35 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Déc-d1 Oct-d3 Sep-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 82