

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Démonstration
 Parcelle : CA60
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Ceci est une parcelle de test

Décalages dates semis FS et binage en BS FS colza et BTH

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 (45)
Chénopode	35 (41)
Gaillet	33

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19 Chénopode 63 Gaillet 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Sep-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass -12 Chénopode -5 Gaillet 0	Date de labour Nov-d2 Ray-grass -2 Chénopode -1 Gaillet -4	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 45 cm Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Chénopode -5 Gaillet 0	Désherbage chimique Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3	Score annuel Ray-grass 5 Chénopode 52 Gaillet 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 7 Chénopode 6 Gaillet 75	Ray-grass -4 Chénopode -4 Gaillet -4	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 12 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Chénopode -2 Gaillet -2	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0		Ray-grass 1 Chénopode 0 Gaillet 69

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Ray-grass 96 Chénopode 31 Gaillet 25	Ray-grass -6 Chénopode -6 Gaillet -6	Ray-grass -3 Chénopode -5 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -2 Chénopode -2 Gaillet -2	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Chénopode 0 Gaillet 0		Ray-grass 86 Chénopode 18 Gaillet 17

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	220 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 84