


Scénario : classique2  
Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : classique  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :   |
|--------------|--|
| Ray-grass    | 32 ( 33)  |

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>Date de semis</b><br>Aoû-d3<br>Ray-grass 96 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Moyen<br>Ray-grass -6 | <b>Interculture</b><br>Jul-d3 50%<br>Ray-grass -1   | <b>Date de labour</b><br>Aoû-d3<br>Ray-grass -11 | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>45 cm<br>Ray-grass 0     | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0                                | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse : Sep-d3<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass -5 | <b>Désherbage chimique</b>                       | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 73                |

#### Année 2 - Blé d'hiver

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Oct-d2<br>Ray-grass 52 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Faible<br>Ray-grass -4 | <b>Interculture</b><br>Sep-d3 50% Sep-d1 50%<br>Ray-grass -10                                 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Ray-grass 0 | <b>Densité de semis</b><br>240 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm<br>Ray-grass 0     | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0                                 | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0 | <b>Désherbage chimique</b>                            | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 38                 |

#### Année 3 - Orge de printemps

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>Date de semis</b><br>Fév-d2<br>Ray-grass 21 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures : Fort<br>Ray-grass -10 | <b>Interculture</b><br>Sep-d1 50% Aoû-d2 50%<br>Ray-grass -8                                  | <b>Date de labour</b><br>Nov-d2<br>Ray-grass -7 | <b>Densité de semis</b><br>220 gr/m²<br>Ray-grass 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>17 cm<br>Ray-grass 0     | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Ray-grass 0                                | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0 | <b>Désherbage chimique</b>                      | <b>Score annuel</b><br>Ray-grass 0                  |

Année 4 - Betteraves

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| <p>Date de semis</p> <p>Mar-d2</p> <p>Ray-grass 35</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> | <p>Interculture</p> <p>Août-d2 50% Sep-d1 50%</p> <p>Ray-grass -8</p>                                   | <p>Date de labour</p> <p>Nov-d2</p> <p>Ray-grass -7</p> | <p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p>     | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p>                                     | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> | <p>Désherbage chimique</p>                              | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 20</p>                    |

Année 5 - Blé d'hiver

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 52</p> | <p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> | <p>Interculture</p> <p>Ray-grass 0</p>  | <p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> | <p>Densité de semis</p> <p>250 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass 0</p>     | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p>                                 | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> | <p>Désherbage chimique</p>                                    | <p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 48</p>                     |